

LIDOCALM

LIDOCAINA 2%



Industria Argentina

Uso en Medicina Veterinaria

FORMULA: Cada 100 ml. Contienen:
Lidocaina (como clorhidrato) 2 g.
Excp. c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES DE USO: Bloqueo nervioso periférico (anestesia truncular, infiltrativa, etc.) Anestesia epidural, infiltración de masas musculares atroficas, contracturadas, mjalgias, dolores musculares, etc.

VIA DE APLICACION: *Inyectable.* Subcutánea: perineural, paravertebral. Epidural. Intramuscular: infiltrativa.

DOSIFICACION: Lidocaina 2% se utiliza por vía SC, por infiltración perineural en la vecindad de la zona afectada, epidural o intramuscular infiltrativa.

La dosis recomendada varía según criterio del Médico Veterinario. La dosis recomendada es de **Infiltración o bloqueo nervioso:**

Animales pequeños: 2-5 ml;

Animales grandes: 10-20 ml.

Duración de la anestesia: 60 / 120 minutos (N.H.Booth).

Epidural:

Bovinos: Epidural posterior: 5-15 ml. según talla o intervención. Duración de la anestesia: 96 / 116 minutos (N.H.Booth). *Epidural anterior:* 25-150 ml. desde esteriorización del pene a operación cesárea. Duración de la anestesia: 220 / 360 minutos (N.H.Booth).

Equinos: 10-30 ml. según talla o intervención. Pequeños animales: 1 ml cada 2-3 kg de peso vivo.

Intervalo entre dosis: la anestesia local de la lidocaina dura entre 30 a 45 minutos pudiéndose repetir de ser necesario. Infiltración o bloqueo nervioso: Se repite a dosis decrecientes en un 50%.

Eptdurales: Se recomienda no utilizar dosis repetitivas pudiendo producirse parálisis posterior irreversible.

EFFECTOS COLATERALES: A la dosis recomendada no produce efectos locales ni generales.

CONTRAINDICACIONES: Animales con daño hepático, animales con antecedentes de hipersensibilidad a la lidocaina. En zonas con desarrollo de procesos infecciosos.

INTOXICACION Y SOBREDOSIS: La aplicación endovenosa de lidocaina produce en grandes dosis depresión del SNC (con dosis de 4 mg/kg de pesos vivo) provocando somnolencia general. La sobredosificación causará temblores musculares, hipotensión, nauseas y vómito.

RESTRICCIONES DE USO: ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-3330160



NO ARROJE EL ENVASE AL CAMPO
DESPUES DE UTILIZARLO

Conservar entre 5° y 25° C.

PRO SER S.A.

Av. L. N. Alem 1698

(2752) Cap. Sarmiento - Bs. As.

Tel/Fax: 02478 482373

proser@labproser.com.ar

www.labproser.com.ar

Director Técnico: Dr. Ricardo I. Vedoya
Médico Veterinario (Matrícula N°2924)

SENASA

Establecimiento Elab. N°5648

Certificado N° 98.223