

PROXY - LA.

Solución Inyectable



Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Uso en Medicina Veterinaria
Contenido Neto: 250 ml.

FORMULA:

Oxitetraciclina Dihidrato 20 g.
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento y control de enfermedades causadas por organismos sensibles a la Oxitetraciclina, los cuales incluyen gran cantidad de bacterias Gram positivas y Gram negativas tanto aerobias como anaerobias, ciertas especies de Micoplasmas, Rickettsias, Protozoarios, Clamydias y Espiroquetas.

Bovinos: Anaplasmosis, neumonía, leptospirosis, piétn, mastitis septicémica, carbunco sintomático, enteritis bacterianas, actinobacilosis, infección umbilical-articular, heridas infectas y otras infecciones producidas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.

Ovinos: Neumonías, carbunco sintomático, piétn, mastitis septicémica, prevención de infecciones post-parto y en todas las infecciones específicas o no causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina.

Porcinos: Neumonías y otras enfermedades respiratorias, Rinitis atrófica, leptospirosis, erisipela, enteritis bacterianas, diarrea de los lechones, infecciones post-quirúrgicas y post-parto y en todas infecciones causadas por gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, Ovinos y Porcinos: 1 ml/10 kg.p.v. (equivale a 20 mg de PROXY-LA.)

Administrar por VÍA INTRAMUSCULAR PROFUNDA en todas las especies. Se recomienda dividir la dosis y aplicar en lugares separados, no debiéndose inyectar más de 20 ml por punto de aplicación. En ovinos de más de 50 Kg es recomendable dividir la dosis y proceder como en el caso anterior. En cerdos con menos de 10 Kg de peso, aplicar vía subcutánea detrás de la oreja; en animales con peso superior a los 10 Kg la aplicación debe ser intramuscular. PROXY-LA. es un antibiótico de acción prolongada, por lo que en general es suficiente administrar una sola dosis. No obstante en infecciones severas puede repetirse la misma a los 3-5 días, quedando a criterio del Médico Veterinario.

RESTRICCIONES DE USO:

Entre la finalización del tratamiento y la faena de los animales para consumo humano, deberán transcurrir para bovinos, ovinos y porcinos, 28 días. No usar en vacas en producción de leche para consumo humano.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar a animales alérgicos a la Oxitetraciclina.
No administrar penicilinas concomitantemente.

PRECAUCIONES:

Almacenar en su envase original.
Evitar el contacto con boca y manos.
Lavarse las manos luego de usar el producto.
Respetar las dosis e intervalos indicados.
Puede llegar a provocar tumefacción y dolor en el punto de inyección.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 - 333 - 0160

Conservar entre 5 y 25 °C



SENASA Certificado N° 06-214



NO ARROJE EL ENVASE AL CAMPO
DESPUES DE UTILIZARLO

Establecimiento Elaborador N°: 5648

Director Técnico:
Ricardo I. Vedoya
Médico Veterinario
Matrícula N°: 2924

PRO - SER S.A.
Av. L. N. Alem 1698 (2752)
Capitán Sarmiento - Prov. Buenos Aires
Tel / Fax: 02478 - 482373
proser@labproser.com.ar
www.labproser.com.ar